

MEN WHO HAVE SEX WITH MEN + HIV



MEN WHO HAVE SEX WITH MEN + HIV

English

Arabic

Bangla

Farsi

Urdu

Spanish

Portuguese

Pashto

French

MEN WHO HAVE SEX WITH MEN + HIV.

What does safer sex between men mean?

By following a few simple guidelines, you can combine sexual pleasure with safer practices.

Insertive or receptive?

Depending on whether you engage in insertive or receptive sex, the risk of HIV transmission varies. For example, if you have receptive anal sex, you run a greater risk of being exposed to the virus if your partner is HIV-positive.

How safe is oral sex?

HIV transmission during oral sex is limited, however, it can happen through pre-ejaculate or ejaculation in the mouth when there is a wound, abrasion, ulcer or inflammation in the mouth, gums or pharynx. The likelihood of transmission increases in this case if the person ejaculating has a high viral load.

Rimming

When licking your partner's anus, you run the risk of being exposed to certain infections such as hepatitis A. However, there are no recorded cases of HIV transmission related to this activity.

Bareback

Don't assume that your sexual partner is HIV-negative just because he didn't use a condom. It's very likely that he too assumes that you are HIV-negative because you didn't ask him to.

If you are in a stable (monogamous) relationship, the decision to have sex without a condom should always be combined with HIV testing after a suitable period of 3 months. Bear in mind that more than half of the young people living with HIV are not aware of their condition. HIV is mainly transmitted by those who do not know they have contracted the virus and, therefore, do not take antiretroviral treatment.

At Checkpoint Athens and Thessaloniki, you can get tested for HIV, hepatitis B and hepatitis C quickly, anonymously and free-of-charge. Book your appointment now!

ATH CHECKPOINT

+30 210 3310400

TUESDAY-SATURDAY: 12:00-20:00

4 Pittaki Street, Monastiraki, Athens

THESS CHECKPOINT

+30 2310 282284

TUESDAY-SATURDAY: 12:00-20:00

95 Egnatias Street, Thessaloniki

HAVING SEX? HAVE A TEST!

الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال + فيروس نقص المناعة البشرية.

ماذا يعني الجنس الآمن بين الرجال؟

باتباع بعض الإرشادات البسيطة، يمكنك الجمع بين المتعة الجنسية والممارسات الأكثر أماناً.

فاعل أم مفعول به؟

اعتماداً على ما إذا كنت تمارس الجنس كفاعل أو مفعول به، يختلف خطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية. على سبيل المثال، إذا كنت تمارس الجنس الشرجي كمفعول به، فأنت أكثر عرضة لخطر التعرض للفيروس إذا كان شريكك مصاباً بفيروس نقص المناعة البشرية.

ما مدى أمان الجنس الفموي؟

إن انتقال فيروس نقص المناعة البشرية أثناء ممارسة الجنس عن طريق الفم محدود، ومع ذلك، يمكن أن يحدث خلال قُبْل القُبْض أو بالقُبْض في الفم عند وجود جرح أو كشط أو قرحة أو التهاب في الفم أو اللثة أو البلعوم. وتزداد احتمالية انتقال العدوى في هذه الحالة إذا كان لدى الشخص الذي يقذف حمل فيروسي عالي.

الحواف

عند لعق فتحة الشرج لشريكك، فإنك تخاطر بالتعرض لعدوى معينة مثل التهاب الكبد A. ومع ذلك، لا توجد حالات مسجلة لانتقال فيروس نقص المناعة البشرية المرتبطة بهذا النشاط.

ممارسة الجنس دون حذر

لا تفترض أن شريكك الجنسي غير مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية لمجرد أنه لم يستخدم الواقي الذكري. من المحتمل جداً أنه يفترض أيضاً أنك غير مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية لأنك لم تطلب منه ذلك.

إذا كنت في علاقة مستقرة (أحادية الزوج)، يجب دائماً الجمع بين قرار ممارسة الجنس دون واقٍ ذكري وبين اختبار فيروس نقص المناعة البشرية بعد فترة مناسبة مدتها 3 أشهر. ضع في اعتبارك أن أكثر من نصف الشباب المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ليسوا على دراية بحالتهم. ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية بشكل رئيسي من قبل أولئك الذين لا يعرفون أنهم مصابون بالفيروس وبالتالي لا يأخذون العلاج المضاد للفيروسات.

في نقطة الفحص في أثينا وفي سالونيك، يمكنك إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد B وC بسرعة ودون الكشف عن الهوية وبالمجان. احجز موعدك الآن!

نقطة الفحص في سالونيك

282284 2310 30+

الثلاثاء - السبت: 12:00- 20:00

95 Egnatias Street, Thessaloniki

نقطة الفحص في أثينا

3310400 210 30+

الثلاثاء- السبت: 12:00- 20:00

4 Pittaki Street, Monastiraki, Athens

هل تمارس الجنس؟ قم بإجراء اختبار!

পুরুষ-পুরুষে সংগম + HIV

পুরুষ-পুরুষে সুরক্ষিত সংগমের মানে কী?

কয়েকটি সহজ নির্দেশিকা মেনে চলে আপনি নিরাপদ পদ্ধতিতে যৌন আনন্দ উপভোগ করতে পারেন।

প্রবেশকারী না ধারণকারী?

আপনি প্রবেশকারী না ধারণকারী কোন ধরনের যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত তার উপর ভিত্তি করে আপনার HIV সংক্রমণের ঝুঁকি কম-বেশি হয়। যেমন, আপনি যদি ধারণকারী হিসেবে পায়ুসংগম করেন, সেক্ষেত্রে আপনার যৌনসঙ্গী HIV-পজিটিভ হলে আপনার সংক্রামিত হয়ে পড়ার ঝুঁকি অনেক বেশি থাকে।

মৌখিক যৌনক্রিয়া বা ওরাল সেক্স কতটা নিরাপদ?

মৌখিক যৌনক্রিয়ার সময় HIV সংক্রমণের ঝুঁকি সীমিত, কিন্তু সেক্ষেত্রে মুখে যদি ক্ষত, কাটা-ছেঁড়া, ঘা থাকে বা মুখে, মাড়িতে বা শ্বাসনালীতে প্রদাহ থাকে, তাহলে মুখের মধ্যে বীর্যপাত করলে বা বীর্য-রস ফেললে তা থেকে সংক্রমণ হতে পারে। সংক্রমণের ঝুঁকি অনেকাংশে বেড়ে যায় যখন বীর্যপাতকারী পুরুষের শরীরে ভাইরাসের মোট পরিমাণ (viral load) যদি অনেক বেশি হয়।

জিভ দিয়ে লেহন (Rimming)

আপনি যখন আপনার যৌনসঙ্গীর পায়ু জিভ দিয়ে লেহন করেন তখন আপনার হেপাটাইটিস A ইত্যাদির মতো কিছু সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে। তবে, এই ধরনের কাজের সঙ্গে HIV সংক্রমণের কোন প্রমাণ এখনও অবধি পাওয়া যায়নি।

কনডমহীন

আপনার যৌনসঙ্গী কনডম ব্যবহার করেননি বলেই যে তিনি HIV-নেগেটিভ এমনটা ধরে নেবেন না। খুব সম্ভবত তিনিও আপনাকে HIV-নেগেটিভ ধরে নিয়েছেন যেহেতু আপনি তাকে কনডম ব্যবহার করতে বলেননি।

আপনি যদি কোন স্থায়ী (একগামী) সম্পর্কে থাকেন, তাহলে কনডম ছাড়া যৌনক্রিয়ার সিদ্ধান্ত অবশ্যই আগে উভয়ের HIV পরীক্ষা করিয়ে পরবর্তী 3 মাস সময় ধরে করা উচিত। এটি মনে রাখতে হবে যে, কমবয়সী যত মানুষ HIV-তে আক্রান্ত তাদের অধিকই জানেন না যে তারা আক্রান্ত। HIV মূলত তাদের দ্বারাই ছড়ায় যারা জানেন না যে তারা এই ভাইরাসে সংক্রামিত, আর তাই, তারা কোন অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল চিকিৎসাও করান না।

এখেন ও থেসালোনিকি Checkpoint-এ আপনি HIV, হেপাটাইটিস B ও হেপাটাইটিস C পরীক্ষাগুলি দ্রুত, বেনামে এবং বিনামূল্যে করাতে পারেন। এখনি আপনার সাক্ষাতের সময় নির্দিষ্ট করুন!

ATH CHECKPOINT

+30 210 3310400

মঙ্গলবার-শনিবার: 12:00–20:00

4 Pittaki Street, Monastiraki, Athens

THESS CHECKPOINT

+30 2310 282284

মঙ্গলবার-শনিবার: 12:00–20:00

95 Egnatias Street, Thessaloniki

!সেত্ৰ করছেন ?পরীক্ষা করান

مردی که با مرد HIV مثبت دیگری رابطه جنسی دارد.

سکس ایمن میان مردان به چه معنی است؟

با پیروی از چند راهنمایی ساده، می‌توانید لذت جنسی را با روش‌های ایمن‌تر ترکیب کنید.

دهنده یا گیرنده؟

بسته به اینکه شما در سکس دهنده یا گیرنده باشید، خطر HIV متفاوت است. به عنوان مثال اگر در در سکس مقعدی گیرنده باشید و شریکتان HIV مثبت باشد، بیشتر در معرض خطر خواهید بود.

سکس دهانی چگونه ایمن خواهد بود؟

انتقال HIV در طول سکس دهانی محدود است، اما هنگامی که جراثیم، خراش، زخم یا آماسی در دهان، در طول سکس دهانی محدود است، اما هنگامی که جراثیم، خراش، زخم یا آماسی در دهان، لثه یا حلق وجود داشته باشد، ممکن است از راه پیش‌انزال یا انزال در دهان رخ دهد. اگر انزال فرد بار ویروسی بالایی داشته باشد، احتمال انتقال در این حالت افزایش می‌یابد.

لیسیدن مقعد

هنگام لیسیدن مقعد شریک جنسیتان، در معرض خطر ابتلا به عفونت‌های خاص مانند هپاتیت A قرار دارید. اگرچه، هیچ موردی از انتقال HIV از این کار تا به حال ثبت نشده است.

بدون کاندوم

چون شریک جنسیتان کاندوم استفاده نمی‌کند فرض نکنید HIV منفی است. به احتمال زیاد چون شما این کار را از او نخواستاید فرض کرده است که شما HIV منفی هستید.

اگر در یک رابطه پایدار (تک شریک جنسی) هستید، تصمیم به سکس بدون کاندوم باید همیشه پس از دوره مناسب 3 ماهه بعد از تست HIV باشد. به یاد داشته باشید که بیش از نیمی از جوانان دارای HIV از ابتلای خود مطلع نیستند. HIV عمدتاً توسط افرادی منتقل می‌شود که نمی‌دانند ویروس را گرفته‌اند و به همین دلیل داروی ضد ویروس مصرف نمی‌کنند.

در Checkpoint آتن و تسالونیکي از شما سریع، رایگان و محرمانه تست HIV، هپاتیت B و هپاتیت C گرفته می‌شود. قرار ملاقات خود را الان رزرو کنید!

THESS CHECKPOINT

+30 2310 282284

سه‌شنبه-شنبه : 12:00 - 20:00

95 Egnatias Street, Thessaloniki

ATH CHECKPOINT

+ 30 210 3310400

سه‌شنبه-شنبه : 12:00 - 20:00

4 Pittaki Street, Monastiraki, Athens

آیا سکس داشته‌ای؟ آزمایش بده!

HIV میں مبتلا مردوں کے ساتھ جنسی عمل کرنے والے مرد۔

مردوں کے محفوظ جنسی عمل سے کیا مراد ہے؟

چند سادہ رہنما ہدایات پر عمل کر کے آپ محفوظ طریقوں سے جنسی تسکین حاصل کر سکتے ہیں۔

داخلی یا وصولی؟

آپ کے داخلی یا وصولی جنسی عمل میں شامل ہونے کے مطابق HIV منتقلی کا خطرہ مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر براستہ مقصد وصولی جنسی عمل کرتے ہیں اور آپ کا ساتھی HIV میں مبتلا ہو تو آپ کو وائرس لگنے کا خطرہ زیادہ ہو گا۔

براستہ منہ جنسی عمل کتنا محفوظ ہے؟

براستہ منہ جنسی عمل میں HIV کی منتقلی محدود ہوتی ہے، لیکن اگر منہ، مسوڑھوں یا حلق میں کوئی زخم، خراش، السر یا سوزش ہو تو منہ میں سرعت انزال یا انزال کے ذریعے ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر انزال کرنے والے شخص کا وائرل لوڈ زیادہ ہو تو منتقلی کا امکان بڑھ جاتا ہے۔

رمنگ

اپنے ساتھی کے مقعد پر زبان پھیرتے ہوئے آپ کو چند انفیکشنز، مثلاً ہیپاٹائٹس اے سے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن اس فعل کے باعث HIV کی منتقلی کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔

کنڈم کے بغیر

اگر آپ کے جنسی ساتھی نے کنڈم استعمال نہیں کی تو یہ فرض نہ کریں کہ وہ HIV سے پاک ہے۔ امکان ہے کہ وہ بھی آپ کو HIV سے پاک سمجھتا ہو کیوں کہ آپ نے اسے کنڈم استعمال کرنے کو نہیں کہا۔ اگر آپ مستحکم (واحد زوج کے ساتھ) تعلق میں ہیں تو کنڈم کے بغیر جنسی عمل کی صورت میں 3 ماہ کی مناسب مدت کے بعد HIV ٹیسٹ بھی کروایا جانا چاہیے۔ ذہن میں رکھیں کہ HIV میں مبتلا آدمے سے زیادہ نوجوان افراد اپنے مرض سے آگاہ نہیں ہوتے۔ مرکزی طور پر وہ لوگ HIV منتقل کرتے ہیں جنہیں خود میں وائرس کی موجودگی کا عمل نہیں ہوتا اور وہ اینٹی ریٹرو وائرل علاج نہیں کرواتے۔

چیک پوائنٹس اینتھنز وار تھیسیلونیکہ پر آپ HIV، ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی کا تیز، گمنام اور مفت ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ ابھی اپنی اپائنٹمنٹ بک کروائیں!

تھیسیلونیکہ چیک پوائنٹ

282284 2310 30+

منگل-ہفتہ: 20:00 - 12:00

95 Egnatias Street, Thessaloniki

اینٹھنز چیک پوائنٹ

3310400 210 30+

منگل-ہفتہ: 20:00 - 12:00

4 Pittaki Street, Monastiraki, Athens

جنسی عمل کرتے ہیں؟ ٹیسٹ کروائیں!

HOMBRES QUE MANTIENEN RELACIONES SEXUALES CON HOMBRES + VIH

¿Qué significa sexo más seguro entre hombres?

Siguiendo algunas guías básicas, podrá combinar placer sexual con prácticas más seguras

¿Activo o pasivo?

Dependiendo de si adopta un rol activo o pasivo durante la práctica sexual, el riesgo de transmisión de VIH varía. Por ejemplo, si adquiere un rol pasivo durante el sexo anal, si la otra persona es VIH positivo, correrá mayor riesgo de exposición al virus.

¿Cómo de seguro es el sexo oral?

La transmisión del VIH durante el sexo oral es limitada, aun así, podría darse mediante la pre-eyaculación o eyaculación en la boca cuando se tienen heridas, abrasión, úlcera o inflamación en la propia boca, encías o faringe. La posibilidad de transmisión aumenta en caso de que la persona positiva tenga una alta carga viral.

Práctica del beso negro o Anilingus

Cuando se trata de lamer el ano de la otra persona, corre el riesgo de exponerse a ciertas infecciones como la Hepatitis A. Sin embargo, no hay registro de casos de transmisión de VIH relacionados con esta actividad.

Práctica “a pelo”

No asuma que la otra persona es VIH negativo solo porque no haya utilizado preservativo. Es muy probable que esa persona también asuma que usted es VIH negativo porque no le ha pedido que lo utilice.

Si se encuentra en una relación (monogámica) estable, la decisión de mantener relaciones sexuales sin preservativo deberá combinarse siempre con realizaciones de test VIH cada 3 meses. Tenga en cuenta que más de la mitad de la juventud VIH positiva no saben que lo son. El VIH es transmitido por aquellas personas que no saben que han contraído el virus y, por tanto, no están siguiendo un tratamiento antirretroviral.

En Checkpoint Athens y Thessaloniki, podrá realizarse pruebas de VIH, Hepatitis B y Hepatitis C de manera rápida, anónima y gratuita. ¡Reserve su cita ahora!

ATH CHECKPOINT

+30 210 3310400

MARTES-SÁBADO : 12:00-20:00

Calle Pittaki 4, Monastiraki, Atenas

THESS CHECKPOINT

+30 2310 282284

MARTES-SÁBADO : 12:00-20:00

Calle Egnatias 95, Thessaloniki

¿MANTIENE RELACIONES SEXUALES? ¡HÁGASE UN TEST!

HOMES QUE TEM RELAÇÕES SEXUAIS COM OUTROS HOMES + HIV

O que quer dizer ter sexo mais seguro entre homens?

Seguindo algumas diretrizes básicas, você poderá combinar o prazer sexual com práticas mais seguras.

Ativo ou passivo?

Dependendo de si tem um rol ativo ou passivo durante o sexo, o risco de transmissão de VIH varia. Por exemplo, si você tem um rol passivo durante o sexo anal, tem mais risco de exposição ao vírus se a outra pessoa é HIV positiva.

Quão seguro é o sexo oral?

A transmissão de HIV durante o sexo oral é limitada, ainda, poderia acontecer mediante a pre-ejaculação e ejaculação na boca se se tem feridas, abrasão, úlcera ou inflamação na própria boca, gengivas ou faringe. A possibilidade de transmissão aumenta no caso de que a pessoa positiva tenha uma alta carga viral.

Prática do “beijo negro” ou Anilingus

Na prática de lambar o ânus da outra pessoa, corre o risco de exposição a certas infecções como a Hepatite A. Porém, não há registro de casos de transmissão de HIV em relação com esta atividade.

Prática “em pelo”

Não presuma que a outra pessoa é HIV negativo só porque não tem utilizado preservativo. É muito provável que essa pessoa também presuma que você é HIV negativo porque não pediu para usá-lo.

Si está numa relação (monogâmica) estável, a decisão de ter relações sexuais sem preservativo deve ser combinado com a realização de teste HIV cada 3 meses. Tenha em mente que mais da metade da juventude HIV positiva, não sabe que é. O HIV é transmitido pelas pessoas que não sabem que contraíram o vírus e, portanto, não estão em tratamento antirretroviral.

No Checkpoint Athens e Thessaloniki, pode fazer teste HIV, Hepatites B y Hepatites C dum jeito rápido, anónimo e gratuito. Reserve já o seu horário!

ATH CHECKPOINT

+30 210 3310400

TERÇA-SÁBADO: 12:00–20:00

Rua Pittaki 4, Monastiraki, Atenas

THESS CHECKPOINT

+30 2310 282284

TERÇA-SÁBADO: 12:00–20:00

Rua Egnatias 95, Thessaloniki

¿TEM RELAÇÕES SEXUAIS? ¿FAÇA UM TEST!

هغه نارینه چې له HIV + نارینوسره جنسي عمل کوي.

د نارینو تر مینځ خوندي جنسي عمل څه معنی لري؟

د یو څو ساده لارښوونو په تعقیبولو لخوا، تاسو کولی شئ جنسي خوند د خوندي کړنو سره یوځای کړئ.

اخیستونکي؟ ورننوستونکي یا

پدې پورې اړه لري چې ایا تاسو په ورننوستونکي یا اخیستونکي جنسي عمل کې بوخت یاست، د HIV خطر توپیر لري. د بیلګې په توګه، که تاسو اخیستونکي د مقعد جنسي عمل ولری، نو تاسو د ویروس سره د مخ کېدو ډیر لوی خطر لرئ که ستاسو ملګری د HIV مثبت وي.

د خولي له لارې جنسي عمل څومره خوندي دی؟

د خولي جنسي عمل په جریان کې د HIV انتقال محدود دی، که څه هم، دا په خوله کې د انزال څخه مخکې یا د انزال له لارې پېښېدای شي کله چې په خوله، اوورو یا پیرینکس کې زخم، خراش، السر یا پړسوب شتون ولری په دې حالت کې د انتقال امکان ډیرېږي که چیرې د سړي انزال لوړ ویږول لود ولري.

ریمینګ

کله چې تاسو د ملګري مقعد څټی، تاسو د یو شمیر انتاناتو لکه هېپاټایټس ای د خطر سره مخ کېږئ. که څه هم، پدې فعالیت پورې اړوند د HIV انتقال هیڅ ډول ثبت شوي پېښې شتون نلري.

پرتله له کاندوم څخه جنسي عمل کول

مه ګڼي چې ستاسو جنسي ملګری HIV منفي دی ځکه چې هغه کاندوم نه دی کارولی. ډیر احتمال شتون لري چې هغه هم ګڼي چې تاسو HIV منفي یاست ځکه چې تاسو د هغه څخه غوښتنه نه وه کړې.

که تاسو په مستحکم (یوښځمنی) اړیکو کې یاست، نو له کاندوم پرته د جنسي عمل پریکړه باید د 3 میاشتو مناسب مودې وروسته تل د HIV تیست سره یوځای شي. په یاد ولری چې له نیمایي څخه ډیر ځوانان چې د HIV سره ژوند کوي د خپل وضعیت څخه خبر ندي. HIV عموماً د هغه چا لخوا انتقالېږي څوک چې خبر نه وي چې دوی په ویروسو اخته شوي او له همدې امله د انټیویرویرول درملنه نه کوي.

د انتز او تیسالونیکي په کتن ټکی کې، تاسو کولی شئ د HIV، هېپاټایټس بی او هېپاټایټس سی ګړندی، بې نومه او وړیا ازموینه وکړئ. خپله لیدښته اوس بک کړئ!

THESS CHECKPOINT

282284 2310 30+

سه شنبه- شنبه : 12:00- 20:00

95 Egnatias Street, Thessaloniki

ATH CHECKPOINT

3310400 210 30+

سه شنبه- شنبه : 12:00- 20:00

4 Pittaki Street, Monastiraki, Athens

جنسي عمل لري؟ ازموینه کوئ!

HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES + VIH.

Que signifie « rapports sexuels protégés entre hommes » ?

En suivant quelques consignes simples, vous pouvez combiner le plaisir sexuel avec des pratiques plus sûres.

Actif ou passif ?

Le risque de transmission du VIH varie selon le rôle lors des rapports sexuels, actif ou passif. Par exemple, si vous avez des relations sexuelles anales passives, vous courez un plus grand risque d'être exposé au virus si votre partenaire est séropositif.

Les relations sexuelles orales sont-elles sans risque ?

La transmission du VIH lors de rapports sexuels oraux est limitée, mais elle peut se produire par éjaculation de liquide pré-séminal ou éjaculation dans la bouche en cas de blessure, d'abrasion, d'ulcère ou d'inflammation dans la bouche, les gencives ou le pharynx. La probabilité de transmission augmente dans ce cas si la personne qui éjacule a une charge virale élevée.

Rapport bucco-anal

En léchant l'anus de votre partenaire, vous courez le risque d'être exposé à certaines infections telles que l'hépatite A. Cependant, il n'existe aucun cas enregistré de transmission du VIH liée à cette activité.

Relation sexuelle non protégée

Ne supposez pas que votre partenaire sexuel est séronégatif simplement parce qu'il n'a pas utilisé de préservatif. Il est très probable qu'il suppose lui aussi que vous êtes séronégatif parce que vous ne lui avez pas demandé de le faire.

Si vous êtes dans une relation stable (monogame), la décision d'avoir des relations sexuelles sans préservatif doit toujours être combinée avec un test de dépistage du VIH après une période appropriée de 3 mois. N'oubliez pas que plus de la moitié des jeunes vivant avec le VIH ne le savent pas. Le VIH est principalement transmis par ceux qui ne savent pas qu'ils ont contracté le virus et qui, par conséquent, ne suivent pas de traitement antirétroviral.

Chez Checkpoint Athens et Thessaloniki, vous pouvez vous faire dépister pour le VIH, l'hépatite B et l'hépatite C rapidement, anonymement et gratuitement. Prenez rendez-vous dès maintenant !

ATH CHECKPOINT

+30 210 3310400

MARDI - SAMEDI: 12:00–20:00

4 Pittaki Street, Monastiraki, Athens

THESS CHECKPOINT

+30 2310 282284

MARDI - SAMEDI: 12:00–20:00

95 Egnatias Street, Thessaloniki

VOUS AVEZ DES RELATIONS SEXUELLES? FAITES LE TEST!

Prevention & Sexual Health Center for Refugees and Immigrants.
Fast, anonymous and cost-free HIV and Hepatitis B and C testing
in your native language.

Michail Voda 200, Athens, 10446



(+30) 2103243133
info@refcheckpoint.gr
www.refcheckpoint.gr
www.facebook.com/refcheckpoint

www.refcheckpoint.gr