


HIV + LIVER DISEASES



with the support of





HIV + LIVER DISEASES

English

Arabic

Bangla

Farsi

Urdu

Spanish

Portuguese

Pashto

French

HIV + LIVER DISEASES

Why should I be kept up to date about my liver?

The liver is a very important organ of the human body, which filters toxins, processes nutrients, stores vitamins and minerals, and releases energy into the blood.

What kinds of liver diseases are there?

There are many kinds of liver diseases. The most widespread are viral hepatitis B and C and non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). If not treated early, they can cause damage to the liver, fibrosis, cirrhosis and liver failure.

Why should I be aware of the condition of my liver?

Liver disease may develop very slowly and may not present any symptoms whatsoever for several years. HIV-positive patients who have some kind of liver disease may present faster disease progression, which renders regular check-ups a must.

Hepatitis C

Chronic hepatitis C is treatable these days. The new medications, administered in the form of pills, can completely eradicate the virus.

Hepatitis B

Chronic hepatitis B is a controllable disease, provided there is continuous monitoring by a doctor. If you are HIV-positive, bear in mind that the treatment you are following may be administered at the same time as the treatments for hepatitis B. The treatment with the least possible side-effects must be decided in consultation with your infectious disease and liver specialist.

Despite the fact that it cannot be completely eradicated, vaccination is the most effective way to prevent the disease.

Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)

Excess consumption of food rich in fats and sugars causes accumulation of fat in the liver, which may cause fibrosis and cirrhosis, while it may even gradually lead to non-alcoholic steatohepatitis (NASH). Chronic use of certain antiretroviral medications may cause accumulation of fat in the liver, so regular liver function testing is necessary.

Can I take antiretroviral medications while I have hepatitis?

Antiretroviral medications may be taken just as safely and effectively when you have hepatitis B or C. However, it is possible that you may experience increased side-effects if your liver has been burdened. In addition, slower recovery of the number of CD4 cells has been observed in these cases, compared to HIV-positive patients not infected with hepatitis.

The treatment with the least possible side-effects must be decided in consultation with your infectious disease and liver specialist. It is necessary that both your doctors fully inform you about everything.

Where can I get more information?

You can contact "Positive Voice", the Greek Association of People Living with HIV, on +30 210 8627572 or Prometheus, the Hellenic Liver Patient Association, on +30 211 0122102.

Positive Voice

13 Agion Anargyron Street, Athens
Tel.: +30 210 8627572
24 Aristotelous Street, Thessaloniki
Tel.: +30 231 5525020
www.positivevoice.gr
e-mail: info@positivevoice.gr

Prometheus

123B Alexandras Avenue, Ampelokipoi
Tel.: +30 211 0122102
www.helpa-prometheus.gr
e-mail: heplaprometheus@gmail.com

HAVING SEX? HAVE A TEST!

أمراض فيروس نقص المناعة البشرية + أمراض الكبد

لماذا يجب أن تكون على اطلاع دائم بشأن حالة الكبد؟
بعد الكبد عضواً مهماً جداً في جسم الإنسان، حيث يقوم بترشيح السموم ومعالجة العناصر الغذائية وتخزين فيتامينات والمعادن وإطلاق الطاقة في الدم.

ما أنواع أمراض الكبد الموجودة؟
نالك أنواع عديدة من أمراض الكبد. وينتقل النوع الأكثر انتشاراً في التهاب الكبد الفيروسي B وC ومرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD). إذا لم يتم علاج هذه الأمراض مبكراً، يمكن أن تسبب ثلثاً للكبد وتليّف وتشمع وقتل الكبد.

لماذا يجب أن تكون على علم بحالة الكبد؟
قد يتتطور مرض الكبد ببطء شديد وقد لا تظهر أي أعراض على الإطلاق لعدة سنوات. وقد يتعرض المرضى المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية الذين يعانون من نوع من أمراض الكبد من تطور أسرع للمرض، مما يجعل الفحوصات المنتظمة ضرورية.

التهاب الكبد C
يمكن علاج التهاب الكبد الوبائي C هذه الأيام، وبإمكان الأدوية الجديدة، التي تُعطى على شكل أقراص، القضاء على الفيروس تماماً.

التهاب الكبد B
لتهاب الكبد B مرض يمكن السيطرة عليه بشرط أن يكون هناك متلازمة مستمرة من قبل الطبيب. إذا كنت مصاباً بفيروس نقص المناعة البشرية، ضع في اعتبارك أن العلاج الذي تتبعه قد يتم إعطاؤه في نفس وقت اعطاء علاجات التهاب الكبد B. ويجب تحديد العلاج باقتراح الأثار الجانبية الممكنة بالتشاور مع أخصائي الأمراض المعدية والكبد. على الرغم من حقيقة أنه لا يمكن القضاء عليه تماماً، فإن التطعيم بعد الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من المرض.

مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)
يؤدي الاستهلاك المفرط للأطعمة الغنية بالدهون والسكريات إلى تراكم الدهون في الكبد، مما قد يؤدي إلى تليف الكبد، في حين أنه قد يؤدي تدريجياً إلى التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH). وقد يؤدي الاستخدام المستمر لبعض الأدوية المضادة للفيروسات الفيروسية إلى تراكم الدهون في الكبد، لذلك فمن الضروري إجراء اختبارات وظائف الكبد بانتظام.

هل يمكنني تناول الأدوية المضادة للفيروسات الفيروسية أثناء إصابتي بالتهاب الكبد؟
يمكن تناول الأدوية المضادة للفيروسات الفيروسية بأمان وفعالية عندما تكون مصاباً بالتهاب الكبد B أو C. ومع ذلك، فمن المحتمل أن تعاني من آثار جانبية متزايدة إذا كان الكبد مقلقاً. إضافة إلى ذلك، فقد لوحظ شفاء أبوطاً بعد خلايا CD4 في هذه الحالات، مقارنة بالمرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية غير المصابين بالتهاب الكبد.
يجب تحديد العلاج باقتراح الأثار الجانبية الممكنة بالتشاور مع أخصائي الأمراض المعدية والكبد. من الضروري أن يطلعك كل من أطبائك بشكل كامل على كل شيء.

أين يمكن العثور على مزيد من المعلومات؟
يمكنك الاتصال بخدمة Positive Voice، الجمعية اليونانية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، على رقم الهاتف: +30 210 8627572 أو Prometheus، جمعية مرضى الكبد اليونانية، على الرقم 0122102 211 +30.

Prometheus
123B Alexandras Avenue, Ampelokipoi
هاتف : 0122102 211 +30
www.helpa-prometheus.gr
البريد الإلكتروني : heplaprometheus@gmail.com

Positive Voice
Agion Anaryyon Street, Athens 13
هاتف : 8627572 210 +30
Aristotelous Street, Thessaloniki 24
هاتف : 5525020 231 +30
www.positivevoice.gr
البريد الإلكتروني : info@positivevoice.gr

هل تمارس الجنس؟ قم بإجراء اختبار!

HIV + লিভারের রোগ

আমার লিভারের সাম্পর্কিতম অবস্থা সম্পর্কের আমার সচেতন থাকা উচিত কেন?
লিভার বা যক্ষ মানব শরীরের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যা বিষাক্ত পদার্থগুলিকে (toxins) ছাঁকে, পুষ্টির প্রক্রিয়াকরণ করে, ডিটামিন ও প্রয়োজনীয় খনিজগুলিকে সংরক্ষণ করে এবং রক্তে শক্তি নির্গত করে।

লিভারের কী কী ধরনের রোগ হয়?

বিভিন্ন ধরনের লিভারের রোগ হয়। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক হল ভাইয়াল হেপাটাইটিস B ও C এবং নন-অ্যালকেহলিক ফ্যাট লিভার ডিজিজ (NAFLD) বা মায়পান বহির্ভূত স্থূল যক্ষ রোগ। দ্রুত চিকিৎসা না করানো হলে, এতে লিভারের ক্ষতি হতে পারে, ফাইব্রোসিস, সিরোসিস ও লিভার বিকল্প হতে পারে।

লিভারের অবস্থা সম্পর্কের আমার সচেতন থাকা উচিত কেন?

লিভারের রোগ খুব ধীরে ধীরে হতে পারে এবং অনেকে বছর ধরে একেবারেই কোনোকম লক্ষণ না-ও দেখা যেতে পারে। যে সব HIV-পজিটিভ রোগীদের কোনোকম লিভারের রোগ থাকে তাদের রোগের অবনতি দ্রুত হতে দেখা যায়, যার জন্য নিয়মিতভাবে চেক-আপ করানো খুবই জরুরি।

হেপাটাইটিস C

দ্বারারোগ বা ক্রিনিক হেপাটাইটিস C রোগ বর্তমানে চিকিৎসাযোগ্য। এই রোগের নতুন ওষুধ-বিষুধ, যেগুলি বড়ির আকারে নিতে হয়, এই রোগের ভাইয়াসকে সম্পূর্ণরূপে নির্মল করতে পারে।

হেপাটাইটিস B

দ্বারারোগ বা ক্রিনিক হেপাটাইটিস B একটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য রোগ, যদি তাকে লাগাতার চিকিৎসকের নজরাদারিতে রাখা যায়। আপনি যদি HIV-পজিটিভ হন, তাহলে মাথায় রাখতে হবে যে, আপনাকে এই রোগের সাথে সাথেই আপনার হেপাটাইটিস B-এর চিকিৎসাৰ ওষুধগুলি দেওয়া হতে পারে। আপনার সংক্রমক রোগ ও লিভার রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সম্ভাব্য ন্যূনতম পাশ্পপ্রতিক্রিয়াজুড় চিকিৎসা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

এই রোগ পুরোপুরি নির্মল করা না গেলেও, এই রোগ থেকে বাঁচে সবচেয়ে ভাল উপায় হল টিকা নেওয়া।

নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাট লিভার ডিজিজ (NAFLD)

ফ্যাট ও শর্করা সমৃদ্ধ খাদ্য অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে লিভারে ফ্যাট জমা হয়, যার দরুণ ফাইব্রোসিস বা সিরোসিস হতে পারে, এবং সেই সঙ্গে কালুক্রমে তা থেকে নন-অ্যালকোহলিক সিটেটেপোটাইটিস (NASH) রোগও হতে পারে কিন্তু কিছু কিছু অ্যাটিটেক্টোভাইয়াল ওষুধ দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহারের ফলেও লিভারে ফ্যাট জমা হতে পারে, আর তাই নিয়মিতভাবে লিভারের স্বাভাবিক ক্রিয়ার পরীক্ষা করিয়ে যাওয়াটা খুবই জরুরি।

হেপাটাইটিস থাকাকালীন আমি কি অ্যানিট্রেটোভাইয়াল ওষুধ ধৈতে পারি?

হেপাটাইটিস B ও C থাকাকালীনও আপনি নিরাপদে ও কার্যকরভাবেই আপনার অ্যাটিটেক্টোভাইয়াল ওষুধগুলি নিতে পারেন। তবে, আপনার লিভার যদি ফ্যাট-ডর্টি হয়ে পড়ে তাহলে আপনি এর জন্য একটু বেশি করে পাশ্পপ্রতিক্রিয়া অনুভব করতে পারেন। সেই সঙ্গে, এই ক্ষেত্রে CD4 কোষগুলির সংখ্যা পুনরুদ্ধারের গতি কমে যেতেও দেখা যায়, সেই সব রোগীদের তুলনায় যারা HIV-পজিটিভ হলেও হেপাটাইটিস রোগে আক্রান্ত নন।

সংক্রমক রোগ ও লিভার রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে সক্রিয় পরামর্শক্রমে সম্ভাব্য সবচেয়ে কম পাশ্পপ্রতিক্রিয়াসম্পর্ক চিকিৎসাৰ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আপনার উভয় চিকিৎসকই আপনাকে সবকিছুর ব্যাপারে পুরোপুরি বুঝিয়ে বলা জরুরি।

আমি কোথা থেকে আরও তথ্য পেতে পারি?

আপনি “Positive Voice”, the Greek Association of People Living with HIV-এর সঙ্গে
+30 210 8627572 নম্বের অথবা Prometheus, the Hellenic Liver Patient Association-এর সঙ্গে
+30 211 0122102 নম্বের যোগাযোগ করতে পারেন।

Positive Voice

13 Agion Anargyron Street, Athens
ফোন: +30 210 8627572
24 Aristotelous Street, Thessaloniki
ফোন: +30 231 5525020
www.positivevoice.gr
ই-মেল: info@positivevoice.gr

Prometheus

123B Alexandras Avenue, Ampelokipoi
ফোন: +30 211 0122102
www.helpa-prometheus.gr
ই-মেল: heplaprometheus@gmail.com

!সেক্তু করছেন ?পরীক্ষা করান

HIV + مثبت بیماری‌های کبدی

چرا باید در خصوص کبدم اطلاعات بهروز داشته باشم؟

کبد عضو مهمی از بدن انسان است، که سومون را پالایش می‌کند، مواد مغذی را پردازش، ویتامین‌ها و مواد معدنی را نخیره و انرژی را در خون آزاد می‌کند.

چه بیماری‌های کبدی وجود دارد؟

بیماری‌های کبدی سیپاری وجود دارند. شایع‌ترین آن‌ها هپاٹیت B و C و ویروسی و کبد چرب غیر-الکلی (NAFLD) است. اگر زود درمان نشوند، ممکن است منجر به زیان رساندن به کبد، فیبروز، سیروز و نار سایی کبدی شوند.

چرا باید مرافق وضعیت کبدم باشم؟

بیماری کبد ممکن است خیلی آهسته ایجاد شود و حتی برای چندین سال هیچ علامتی نداشته باشد. بیماران HIV مثبت، که بیماری کبدی نیز دارند، ممکن است پیشرفت بیماری سریع‌تری داشته باشند و انجام چکاپ‌های مداوم برای آن‌ها ضروری است.

هپاٹیت C

همان‌طوری که مزمن این روزها قابل درمان است. داروهای جدید که بهصورت قرص ساخته شده‌اند می‌توانند بهطور کامل این ویروس را ریشه‌گیر کنند.

هپاٹیت B

بیماری هپاٹیت B مزمن مشروط به اینکه مدام توسط پزشک کنترل شود، قابل کنترل است. اگر HIV، مثبت هستید به یاد داشته باشید درمانی که پیش می‌گیرید ممکن است هم‌زمان با درمان هپاٹیت B نیز مدیریت شود. در مورد داروهای دارای حداقل عوارض باید با مشاوره متخصص بیماری عفونی و کبد تصمیم‌گیری شود. با وجود این واقعیت که نمی‌توان آن را کامل ریشه‌گیر کرد، واکسیناسیون مؤثرترین راه برای پیشگیری از این بیماری است.

بیماری کبد چرب غیر-الکلی (NAFLD)

صرف زیاد مواد غذایی سرشار از چربی و قند موجب تجمع چربی در کبد می‌شود، که منجر به فیبروز و سیروز می‌شود و حتی ممکن است به تدریج منجر به سیتوپنی هپاٹیت (NASH) شود. استفاده مزمن از بعضی داروهای ضدویروسی نیز ممکن است منجر به جمع شدن چربی در کبد شود، بنابراین بررسی مدام عملکرد کبد ضروری است.

وقتی هپاٹیت دارم، می‌توانم داروهای ضدویروسی مصرف کنم؟

هنگامی که مبتلا به هپاٹیت B یا C هستید، داروهای ضدویروسی می‌توانند به همان اندازه این و مؤثر مصرف شوند. اما اگر کبد شما تحت فشار قرار گرفته باشد، ممکن است عوارض جانبی پیشتری را تجربه کنید. علاوه بر این، در مقایسه با بیماران HIV مثبت که به هپاٹیت مبتلا نشده‌اند، مشاهده شده است که شمار سلول‌های CD4 در این حالات کنترل بازیابی می‌شوند. باید با مشاوره با متخصص بیماری عفونی و کبد درباره درمان با حداقل عوارض جانبی تصمیم‌گیری شود. لازم است که هردو پیشکشان، شمارا درباره همه موارد مطلع مطلع باشند.

چگاه می‌توانم اطلاعات پیشتری بدست بیاورم؟

می‌توانید با انجمن یونانی افراد مبتلا به HIV، "صدای مثبت" با شماره +30 210 8627572 یا پرومتنوس، انجمن بیماران کبدی یونان به شماره +30 211 0122102 تماس بگیرید.

صدای مثبت

Agiou Anargyron Street, Athens 13

تلفن : 8627572 210 +30

Aristotelous Street, Thessaloniki 24

تلفن: 5525020 210 30+

www.positivevoice.gr

ایمیل : info@positivevoice.gr

آیا سکس داشته‌ای؟ آزمایش بده!

پرومتنوس

123B Alexandras Avenue, Ampelokipoi
تلفن : 0122102 211 +30
www.helpa-prometheus.gr
ایمیل : heplaprometheus@gmail.com

HIV + جگر کے امراض

مجھے اپنے جگر کے متعلق آگاہ کیوں رہنا چاہیے؟

جگر انسانی جسم کا انتہائی ابھ عضو ہے، جو ٹائمز کو علیحدہ کرتا ہے، غذائی اجزاء پر عمل کرتا ہے، وٹامنز اور معنديات محفوظ کرتا ہے اور خون میں تو انائی خارج کرتا ہے۔

جگر کے کئی اقسام کے امراض موجود ہیں؟

جگر کے کئی اقسام کے امراض موجود ہیں۔ عام ترین امراض میں پہلے والے بیپیٹاشس ہی اور سی اور غیر الكوھلک فیٹی لیور مرض (NAFLD) شامل ہیں۔ اگر جلد علاج نہ کروایا جائے تو یہ جگر کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور فائبروسز، سروسز اور جگر فیل بوجانے کا باعث بن سکتے ہیں۔

مجھے اپنے جگر کی حالت سے کیوں آگاہ رہنا چاہیے؟

جگر کے امراض اپستہ اپستہ نمو پاتے ہیں اور ممکن ہے کہ کئی سالوں تک علامات ظاہر نہ ہوں۔ HIV میں مبتلا جن مریضوں میں جگر کے امراض پائے جاتے ہیں، ان کی بیماری تیزی سے بڑھتی ہے، جس کے باعث باقاعدہ معانع لازمی بوتے ہیں۔

بیپیٹاشس سی

اچ کل دائمی بیپیٹاشس سی کا علاج ممکن ہے۔ گولیوں کی صورت میں دی جانے والی نئی ادویات وائزس کو پوری طرح ختم کر سکتی ہیں۔

بیپیٹاشس بی

اگر ڈاکٹر مسلسل نگرانی کرے تو دائمی بیپیٹاشس بی پر قابو پایا جاسکتا ہے۔ اگر آپ HIV میں مبتلا ہیں تو یاد رکھیں کہ ممکن ہے کہ آپ کا علاج بیپیٹاشس بی کے علاج کے ساتھ ایک بی وقت پر ہو۔ آپ کے وباہی مرض اور جگر کے مابر ڈاکٹر کے ساتھ مشاورت کے ذریعے کم از کم ممکنہ ضمنی اثرات والا علاج طے کیا جانا چاہیے۔ اگرچہ اس مرض کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جاسکتا، اس کے انسداد کا مؤثر ترین طریقہ ویکسین ہے۔

غیر الكوھلک فیٹی لیور مرض (NAFLD)

فیش اور شوگر والی خواراک کے حد سے زیادہ استعمال سے جگر میں چکنائی جمع بو جاتی ہے، جو فائبروسز اور سروسز کا باعث بنتی ہے، جیکہ یہ بتدریج غیر الكوھلک اسٹیٹو بیپیٹاشس (NASH) کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ چند ایتنی ریٹرو وائزل ادویات کے مستقل استعمال سے جگر میں چکنائی جمع بو سکتی ہے، اس لئے جگر کے فعل کا باقاعدہ معانعہ لازمی ہے۔

کیا بیپیٹاشس کے ساتھ میں اینٹی ریٹرو وائزل ادویات لے سکتا ہوں؟

اگر آپ کو بیپیٹاشس بی یا سی بو تو ایتنی ریٹرو وائزل ادویات انتی بی محفوظ اور مؤثر بوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کے جگر پر بوجہ ریبا تو ممکن ہے کہ آپ کے ضمنی اثرات میں اضافہ بو جائے۔ اس کے علاوہ، بیپیٹاشس سے پاک HIV مریضوں کی نسبت ایسے کیس میں CD4 سیلز کی تعداد میں اپستہ بحالی کا مشابہ کیا گیا ہے۔

آپ کے وباہی مرض اور جگر کے مابر ڈاکٹر کے ساتھ مشاورت کے ذریعے کم از کم ممکنہ ضمنی اثرات والا علاج طے کیا جانا چاہیے۔ یہ اب ہے آپ کے دونوں ڈاکٹرز آپ کو بر چیز کے بارے میں اچھی طرح معلومات دیں۔

مجھے مزید معلومات کیا ملے گی؟

آپ HIV کے ساتھ رہنے والے افراد کی بیونانی اسوسی ایشن ”پاریٹو وائس“ سے 30+ 8627572 210 30+، یا جگر کے مریضوں کی بیلنک اسوسی ایشن پرمیٹھیس سے 211+30 0122102 0122102 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

پاریٹو وائس

Agion Anargyron Street, Athens 13

ٹیلفون: 8627572 210 +30

Aristotelous Street, Thessaloniki 24

ٹیلفون: 5525020 210 30+

www.positivevoice.gr

ای میل: info@positivevoice.gr

جنسی عمل کرتے ہیں؟ ٹیسٹ کروائیں!

پرمیٹھیس

123B Alexandras Avenue, Ampelokipoi

ٹیلفون: 0122102 211 +30

www.helpa-prometheus.gr

ای میل: heplaprometheus@gmail.com

VIH + ENFERMEDADES HEPÁTICAS

¿Por qué debo hacer un seguimiento del estado de mi hígado?

El hígado es un órgano del cuerpo humano muy importante, el cual filtra toxinas, procesa nutrientes, y almacena vitaminas y minerales, además de dar energía a la sangre.

¿Qué tipo de enfermedades de hígado existen?

Existen muchas, pudiendo destacar como aquellas más extendidas las Hepatitis víricas B y C, así como la Esteatohepatitis no alcohólica (EHNA). Si no se trata de manera temprana, pueden causar daño al hígado, fibrosis, cirrosis e insuficiencia hepática.

¿Por qué debo ser consciente del estado de mi hígado?

Las enfermedades hepáticas pueden desarrollarse lentamente, pudiendo incluso no presentar síntomas en los primeros años. En pacientes VIH positivos, este tipo de enfermedades puede presentar un desarrollo más rápido, por lo que son necesarios chequeos regularmente.

Hepatitis C

Existe tratamiento hoy en día para la Hepatitis C crónica. Las nuevas medicaciones, administradas en forma de pastilla, eliminan el virus.

Hepatitis B

La Hepatitis crónica B es una enfermedad controlable, siempre y cuando exista un monitoreo regular por un médico. Si usted es VIH positivo/a, tenga en cuenta que el tratamiento que sigue puede ser administrado al mismo tiempo que el tratamiento contra la Hepatitis B. El tratamiento con menor probabilidad de efectos secundarios debe ser decidido en consulta con un especialista de hígado y de la enfermedad en cuestión.

Es cierto que no puede ser eliminada completamente, por lo que la vacunación es el modo más eficaz para prevenirla.

Esteatohepatitis No Alcohólica (EHNA)

El consumo excesivo de alimentos ricos en grasas y azúcar provoca la acumulación de grasa en el hígado, lo cual podría causar fibrosis y cirrosis, pudiendo llegar gradualmente a una Esteatohepatitis No Alcohólica (EHNA). El uso crónico de ciertos medicamentos antirretrovirales, puede causar una acumulación también de grasa en el hígado, por lo que es necesario realizar test de control de su funcionamiento.

¿Puedo tomar medicación antirretroviral teniendo Hepatitis?

Las medicaciones antirretrovirales pueden tomarse también de manera segura y eficaz una vez se tiene Hepatitis B o C. Sin embargo, cabe la posibilidad de que experimente efectos secundarios mayores en el caso de que su hígado esté sobrecargado. Además, se ha observado una recuperación más lenta del número de células CD4, en comparación con pacientes VIH positivos no infectados de hepatitis.

El tratamiento con menor probabilidad de tener efectos secundarios para la persona deberá ser decidido en consulta con su especialista del hígado y de enfermedades infecciosas. Es necesario que todos los médicos involucrados le informen plenamente de todo.

¿Dónde puedo encontrar más información?

Puede contactar "Positive Voice", Greek Association of People Living with HIV (Asociación Griega para Personas que viven con VIH), llamando al teléfono +30 210 8627572 o mediante Prometheus, the Hellenic Liver Patient Association (Asociación Helénica de Pacientes Hepáticos), llamando al teléfono +30 211 0122102.

Positive Voice

Calle Agion Anargyron 13, Atenas
Tel.: +30 210 8627572
Calle Aristotelous 24, Thessaloniki
Tel.: +30 231 5525020
www.positivevoice.gr
e-mail: info@positivevoice.gr

Prometheus

Avenida Alexandras 123B, Ampelokipoi
Tel.: +30 211 0122102
www.helpa-prometheus.gr
e-mail: helaprometheus@gmail.com

¿MANTIENE RELACIONES SEXUALES? ¡HÁGASE UN TEST!

VIH + DOENÇAS DO FÍGADO

¿Por que devo fazer um seguimento do status do meu fígado?

O fígado é um órgão do corpo humano muito importante, que filtra toxinas, processa nutrientes e armazena vitaminas e minerais, além de dar energia ao sangue.

¿Que tipo de doenças hepáticas existem?

Embora que existem muitas, podemos destacar com as mais populares as Hepatites viral B y C, além da Doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA). Se não for tratada pronto, poderia causar doença ao fígado, fibrose, cirrose e insuficiência hepática.

¿Por que devo estar ciente do estado do meu fígado?

As doenças hepáticas podem se desenvolver lentamente, podendo nem apresentar sintomas nos primeiros anos. Em pacientes HIV positivos, as doenças hepáticas podem apresentar um desenvolvimento mais rápido, pelo que são necessários verificações (testes) regularmente.

Hepatite C

Existe tratamento para a Hepatite C crônica. Os novos medicamentos, administrados em forma de pílula, eliminam o vírus.

Hepatite B

A Hepatite crônica B, sempre que exista um acompanhamento de um médico. Si você for HIV positivo, tenha em conta que o tratamento que você vai seguir pode ser administrado ao mesmo tempo que o tratamento contra a Hepatite B. O tratamento com menor probabilidade de ter efeitos secundários deve ser decisão de um especialista de fígado e da doença em questão.

Embora que na pode ser eliminada completamente, a vacinação e o jeito mais eficazes na prevenção.

Doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA)

O consumo excessivo de alimentos ricos em gordura e açúcar pode provocar a acumulação de gordura no fígado, podendo chegar à fibrose, cirrose e gradualmente provocar Doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA). O uso crônico de certos medicamentos antirretrovirais, pode provocar uma acumulação também de gordura no fígado, pelo que precisa de fazer teste de controle do funcionamento do fígado.

¿Posso tomar medicação antirretroviral tendo Hepatite?

Os medicamentos antirretrovirais podem ser tomados também de um jeito seguro e eficaz se você tem Hepatite B o C. Porém, existe a possibilidade de ter efeitos secundários maiores no caso seu fígado esteja sobrerecarregado. Além de isso, é possível uma recuperação mais lenta do número das células CD4 em comparação com pacientes HIV positivos não infetados de Hepatite.

O tratamento com menor probabilidade de ter efeitos secundários pra a persona deverá ser decidida por um especialista do fígado e de doenças infeciosas. E preciso que todos os médicos envolvidos no processo trabalhem em colaboração.

¿Onde posso encontrar mais informações?

Pode contarlar "Positive Voice", Greek Association of People Living with HIV (Associação Grega para Pessoas vivendo com VIH), ligando ao telefone +30 210 8627572 o via Prometheus, the Hellenic Liver Patient Association (Associação Helénica de Pacientes Hepáticos), ligando ao telefone +30 211 0122102.

Positive Voice

Rúa Agion Anargyron 13, Atenas
Tel.: +30 210 8627572
Rúa Aristotelous 24, Thessaloniki
Tel.: +30 231 5525020
www.positivevoice.gr
e-mail: info@positivevoice.gr

Prometheus

Avenida Alexandras 123B, Ampelokipoi
Tel.: +30 211 0122102
www.helpa-prometheus.gr
e-mail: helaprometheus@gmail.com

¿MANTIENE RELACIONES SEXUALES? ¡HÁGASE UN TEST!

HIV + د ځګر نارو غې

ولی زه پايد د خپل ځیګر په اړه تازه معلومات وساتم؟

ځیګر د انسان د بدن یو مهم غږی دی، کوم چې سمييات از هر پاکوی، مغذي مواد پروسس کوي، ویتامينونه او مینرالونه زخیره کوي، او په وينه کي انړی خوشی کوي.

د ځیګر کوم بول نارو غې شتون لري؟

د ځګر د نارو غې دير دلوونه لري. ترنولو یراخه بي د ویروس هیپاتایتس B او C او (NAFLD). که ژر درملنه بي ونشۍ، دوی گولې شي ځګر ته زیان ورسوی، فلایروس، سیروسیس، سیروسیس او ځګر د کاره لویدل پایله لري.

ولی زه پايد د خپل ځګر له وضعیت خبر شم؟

د ځیګر نارو غې ممکن خورا ورو وده وکري او ممکن د خو کلونو لپاره هیث بول علامې خرکند نه کري. د HIV مثبت نارو غان چې د ځیګر خینې نارو غې وده وکري، د کوم لپاره چې منظم معاینات اړین.

هیپاتایتس سی

اورډي مودي هیپاتایتس C، بیدي ورخو کي د درملني ور دی. نوي درمل، د کولیو په بنې کي ورګول کېږي، گولې شي په بشپړ بول ویروس له منځه یوسې

هیپاتایتس بی

داورډي مودي هیپاتایتس B د کنترول ور نارو غې ده، په دی شرط چې د داکټر لخوا دوامداره خارنه وي. که تاسو د HIV مثبت باست، نو په یام کي ونسې هغه درملنه چې تاسو بي کوي ممکن په روتنه وخت کي ورکړل د هیپاتایتس بی درملني په توګه. د لبرترلره ممکنه جانبي عوارضو سره درملنه بايد ستاسو د ساري نارو غې او ځیګر متخصص سره په مشوره پرېړکړه وشي د دی حقیقت سره چې دا نتشي گولې په بشپړ بول له منځه یوسې، واکسین کول د نارو غې مخنيوی ترنولو اغښمنه لاره ده.

د غیر ګولې غور ځیګر نارو غې (NAFLD)

د غور او شکو دې خوارو پېر مصرف په ځګر کي د غور د تجمع لامل کېږي، کوم چې ممکن د فلایروسیس او سیروسیس لامل شې، پداسي حل کي چې دا حتی ورو ورو د غیر ګولې سینتو هیپاتایتس لامل کېږي (NAFLD) د خینې انتېرېتروویرول درموند اوړډي مودي لپاره کارول ممکن په ځیګر کي د غور د تجمع لامل شې، نو د ځګر منظمه معاینه کول اړینه ده.

ایازه ګولې شم د انتېرېتروویرول درمل واخلم پداسي حل کي چې زه هیپاتایتس لم؟

د انتېرېتروویرول درمل ممکن په خوندي او موژره بول وکارول شي کله چې تاسو هیپاتایتس بي یاسې لری. که خه هم، دا امکان لري چې تاسو ممکن دیاتو ارځیزې تجربه وکړئ که پېړی ستاسو خګر تر بار لاندې راشي سرېږد پرداي، پدې حالتونو کې CD4 حجر شمېر ورو ورو رغیدل لبید شوې، د HIV مثبت نارو غانو په پرتله چې په هیپاتایتس اختنه ندي. د لبرترلره ممکنه ارځیزې وغېزرو سره درملنه بايد ستاسو د ساري. نارو غې او ځګر متخصص سره په مشوره پرېړکړه وشي. دا اړینه د چې ستاسو واره داکټران په بشپړ بول تاسو د هرڅه په اړه خبر کري.

زه نور معلومات چېرته ترلاسه کولي شم؟

تاسو کولي شې Positive Voice، د HIV سره د یونان د خلکو ژوند کولو توګلي سره، په ونسې پاپرو میتیووس، د هلینېک ځیګر نارو غانو توګله سره په 0122102 211 30 +

Prometheus
123B Alexandras Avenue, Ampelokipoi
تلفون: +30 0122102 211
www.helpa-prometheus.gr
بریښناлиک: heplaprometheus@gmail.com

Positive Voice
Agion Anargyron Street, Athens 13
تلفون: 8627572 210 +30
Aristotelous Street, Thessaloniki 24
تلفون: 5525020 231 +30
www.positivevoice.gr
بریښناлиک: info@positivevoice.gr

جنسي عمل لري؟ ازموينه کوي!

VIH + MALADIES DU FOIE

Pourquoi devrais-je suivre l'état de mon foie ?

Le foie est un organe très important du corps humain, qui filtre les toxines, traite les nutriments, stocke les vitamines et les minéraux, et libère de l'énergie dans le sang.

Quels sont les types de maladies du foie ?

Il existe de nombreux types de maladies du foie. Les plus répandues sont l'hépatite virale B et C et la maladie hépatique grasse non alcoolique (NAFLD). Si elles ne sont pas traitées à temps, elles peuvent causer des dommages au foie, une fibrose, une cirrhose et une insuffisance hépatique.

Pourquoi devrais-je connaître l'état de mon foie ?

Les maladies du foie peuvent se développer très lentement et ne présenter aucun symptôme pendant plusieurs années. Les patients séropositifs qui souffrent d'une maladie du foie peuvent présenter une progression plus rapide de la maladie, ce qui rend les examens réguliers indispensables.

L'hépatite C

L'hépatite C chronique peut être traitée de nos jours. Les nouveaux médicaments, administrés sous forme de pilules, peuvent éradiquer complètement le virus.

L'hépatite B

L'hépatite B chronique est une maladie contrôlable, à condition qu'elle soit suivie en permanence par un médecin. Si vous êtes séropositif, n'oubliez pas que le traitement que vous suivez peut être administré en même temps que les traitements contre l'hépatite B. Le traitement ayant le moins d'éventuels effets secondaires doit être défini en consultation avec votre spécialiste des maladies infectieuses et du foie.

Bien qu'elle ne puisse pas être complètement éradiquée, la vaccination est le moyen le plus efficace de prévenir la maladie.

Maladie hépatique grasse non alcoolique (NAFLD)

Une consommation excessive d'aliments riches en graisses et en sucres entraîne une accumulation de graisses dans le foie, ce qui peut provoquer une fibrose et une cirrhose, alors qu'elle peut même conduire progressivement à une stéatohépatite non alcoolique (NASH). L'utilisation chronique de certains médicaments antirétroviraux peut entraîner une accumulation de graisses dans le foie, d'où la nécessité de procéder régulièrement à des tests de la fonction hépatique.

Puis-je prendre des médicaments antirétroviraux lorsque je souffre d'une hépatite ?

Les médicaments antirétroviraux peuvent être pris de manière tout aussi sûre et efficace lorsque vous avez une hépatite B ou C. Cependant, il est possible que vous ressentiez des effets secondaires plus importants si votre foie a été surchargé. On a également observé dans ces cas une récupération plus lente du nombre de cellules CD4 par rapport aux patients séropositifs non atteints par l'hépatite. Le traitement le moins nocif possible doit être décidé en consultation avec votre spécialiste des maladies infectieuses et du foie. Il est nécessaire que vos deux médecins vous informent pleinement sur tout.

Où puis-je obtenir plus d'informations ?

Vous pouvez contacter « Positive Voice », l'association grecque des personnes vivant avec le VIH, au +30 210 8627572 ou Prometheus, l'association hellénique des malades du foie, au +30 211 0122102.

Positive Voice

13 Agion Anargyron Street, Athènes
Tél. : +30 210 8627572
24 Aristotelous Street, Thessaloniki
Tél. : +30 231 5525020
www.positivevoice.gr
Courriel : info@positivevoice.gr

Prometheus

123B Alexandras Avenue, Ampelokipoi
Tél. : +30 211 0122102
www.helpa-prometheus.gr
Courriel : heplaprometheus@gmail.com

VOUS AVEZ DES RELATIONS SEXUELLES? FAITES LE TEST!

**Prevention & Sexual Health Center for Refugees and Immigrants.
Fast, anonymous and cost-free HIV and Hepatitis B and C testing
in your native language.**

Michail Voda 200, Athens, 10446



(+30) 2103243133
info@refcheckpoint.gr
www.refcheckpoint.gr
www.facebook.com/refcheckpoint

www.refcheckpoint.gr